



ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES DE SEGOVIA.

Carretera del Whisky s/n. Segovia. Apartado de Correos 496.

Tfno. 659 91 42 11 www.perritosdesegovia.com

PROYECTO PARA EL CONTROL DE COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS

Segovia, julio de 2007

1. INTRODUCCIÓN.

Un gato callejero es un gato que ha regresado a un cierto grado de estado salvaje. Tales gatos, provenientes de gatos domésticos que se han perdido o han sido abandonados, han aprendido a vivir al aire libre o en inmuebles tales como almacenes, fábricas, edificios abandonados y graneros.

Estudios realizados en Estados Unidos, donde se calcula que hay 60 millones de gatos asilvestrados, revelan que hasta un 60% de los gatos domésticos no esterilizados acaban convirtiéndose en gatos callejeros antes de 3 años. La influencia hormonal durante la época de celo es tan intensa que hace que muchos machos y hembras sigan su instinto y se escapen de su confortable hogar al que muchas veces no sabrán volver una vez finalizado el celo. En literatura veterinaria se ha denominado “síndrome del gato paracaidista” (*“high rise syndrome”*) al conjunto de lesiones habituales en gatos que caen de una gran altura al cometer imprudencias, muchas veces queriendo tener acceso al exterior de la vivienda en época de celo. Como los gatos se reproducen a una velocidad 13 veces mayor que los perros y 45 veces superior a los humanos, la superpoblación de estos crea problemas en la comunidad, la empresa o los jardines. Para prevenir que esto ocurra se debiera educar en la tenencia responsable de los gatos domésticos y lograr que la esterilización fuera una práctica habitual.

Los gatos asilvestrados se adaptan tanto a las áreas urbanas como a las rurales, estableciéndose en callejones y estacionamientos de autos. Muchos de ellos dependen de la gente para su alimentación, sea un cuidador de gatos que le da comida dos veces al día, o el contenedor de un restaurante o similares. Pocos gatos callejeros subsisten sólo de la caza.

Los gatos callejeros forman parte de la fauna urbana al igual que las palomas y, aunque no sean tan evidentes, las ratas y ratones. Los gatos han ayudado al hombre a controlar las poblaciones de roedores tanto en el campo, donde protegen los almacenes de grano, como en las ciudades (recordemos la peste bubónica que asoló Europa en la Edad Media y que se extendió rápidamente al aumentar la población de roedores por la persecución que sufrieron los felinos). Los gatos callejeros están tan integrados en el medio ambiente de las ciudades y de nuestras vidas que, normalmente pasan

desapercibidos y sólo se hacen notar cuando, a causa de la superpoblación, comienzan a ser un problema medioambiental.

Los gatos asilvestrados tienen tendencia a formar colonias dado su carácter territorial. Las hembras pasan la mayor parte de su vida gestantes y hambrientas. La mayor parte de los gatitos acaban muriendo por las enfermedades infecciosas, el hambre y el frío, atropellados, envenenados o torturados por gamberros sin escrúpulos. Los gatos machos también sufren esta “selección natural” mientras buscan comida, defienden su territorio y se pelean con otros machos para montar a las hembras en celo.

2. EL CONTROL DE COLONIAS DE GATOS.

El enfoque tradicional para el control de las colonias de gatos callejeros ha sido “**capturar-matar**”. Generalmente la captura se realiza utilizando jaulas-trampa y después se les eutanasia. Este método falla a largo plazo por varias razones:

- 1) No es fácil capturar a todos los gatos de una colonia callejera. Si hay una gran cantidad de gatos puede llevar varios días y una gran persistencia lograrlo. Generalmente los encargados de esta tarea (funcionarios o empresas contratadas para tal fin) sitúan algunas trampas, atrapan a algunos gatos y hacen una reducción temporal de la colonia, pero los gatos restantes crían más, hasta llegar nuevamente al techo impuesto por la fuente de alimentación.
- 2) En el supuesto de que todos los gatos de una colonia se capturen y eliminen, a largo plazo no desaparecería la población debido al “efecto de vacío”, observado por Roger Tabor, naturalista y biólogo reconocido mundialmente como una de las principales autoridades en gatos, en sus estudios de los gatos callejeros en Londres. Ninguna colonia es una isla, sino que está rodeada por otros grupos de gatos callejeros en territorios colindantes, de manera que si se quita una colonia de gatos pero permanecen las fuentes de alimento, los gatos de territorios vecinos se moverán hacia allí y comenzará de nuevo el ciclo de reproducción. Si la colonia estuviera ocupada por suficientes gatos, no aparecerían estos nuevos inquilinos.

- 3) Los cuidadores de los gatos callejeros son una casta devota que hará todo lo que esté a su alcance para alimentar y proteger a sus tutelados, interfiriendo con los esfuerzos de captura. El enfoque capturar-matar convierte a estos amantes de los animales en enemigos de una campaña de este tipo.

Otra de las alternativas tradicionales es **eliminar las fuentes de alimento**, pero es más fácil decirlo que hacerlo. La fuente de alimento puede ser la basura diaria de un restaurante, la que se deja abandonada o las latas de conserva que los amantes de los gatos continuamente les llevan. Intentar controlar todo esto para eliminar el alimento disponible creemos que no es una alternativa práctica.

En el otro extremo, está el “**modelo de rescate**”, que considera a los gatos como animales esencialmente domésticos, que pertenecen a hogares humanos, donde deben ser colocados. Esta visión sólo es posible en áreas donde haya unos pocos gatos perdidos o abandonados recientemente. Ahora bien, cuando el número de gatos callejeros se cuenta por cientos o miles (no hay estadísticas) no tiene sentido por dos razones:

- 1) Cuando los gatos callejeros llegan a adultos son muy difíciles de domesticar. El grado de asilvestramiento depende de su edad, de las generaciones que han vivido fuera de un hogar humano, del contacto regular con las personas y de su personalidad. Muchas personas bien intencionadas, convencidas de que “salvan” a un gato callejero llevándolo a casa o al refugio de animales, condenan a la pobre criatura a una vida escondida y un miedo permanente. En estos casos, la opción más compasiva será permitir que siga viviendo al aire libre, con riesgos pero en libertad.
- 2) No hay hogares disponibles para todos ellos. En España, aunque no hay estadísticas fiables, se calcula que hay más de 2 millones de gatos asilvestrados, por lo que en Segovia capital pudiera haber entre 2.000 y 3.000 gatos callejeros, la mayoría de los cuales son nuevas generaciones de gatos domésticos que escaparon o fueron abandonados en su día.

La propuesta de las asociaciones defensoras de los animales es emplear el procedimiento de “**capturar-esterilizar-soltar**”, conocido por las siglas inglesas **TNR** (Trap-Neuter-Return), porque es el único método que ha demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros tanto en colonias particulares como en comunidades enteras, además de ser compasivo porque respeta a los gatos el derecho de vivir y les provee de una calidad de vida tan alta como sea posible, según las circunstancias. La captura se realiza a través de jaulas-trampa por parte de voluntarios. Posteriormente, los gatos son llevados a veterinarios concertados, se les realiza una valoración sanitaria, se les esteriliza y se les identifica mediante una ficha técnica veterinaria y un corte en la oreja. A las 48 o 72 horas son devueltos a su entorno donde se han dispuesto comederos y bebederos, siendo controlados por los cuidadores voluntarios.

3. PROYECTO CAPTURAR-ESTERILIZAR-SOLTAR.

A continuación se describen los pasos necesarios para llevar a la práctica este proyecto en una colonia.

1) Aprender y educar.

Antes de intentar establecer el sistema en una colonia se debe aprender tanto como sea posible sobre el método capturar-esterilizar-soltar. El trabajo no es sólo cuidar de los gatos sino también actuar como abogado de ellos, para lo cual se necesita conocer bien el tema. Afortunadamente existen recursos disponibles que permiten aprender rápidamente y aplicar la experiencia de otros municipios a este tema.

2) Desarrollar buenas relaciones con la comunidad.

Los territorios de los gatos callejeros están en lugares donde las personas residen o trabajan y tienen relaciones con los gatos. Muchos disfrutan con los gatos, les alimentan y cuidan. Otros ven a los gatos como un fastidio y quieren deshacerse de ellos. Es necesario tener en cuenta todas las actitudes para asegurar el éxito del proyecto y, antes de iniciar el mismo, mantener reuniones con todos los vecinos, si es una urbanización, o con los trabajadores y responsables si es una empresa. Todos tienen que entender lo beneficiosos que son los gatos como

raticida ecológico y que con la esterilización y el control sanitario no hay riesgo alguno, se evita la superpoblación y se reducen los malos olores. Sólo cuando todo el mundo está de acuerdo se puede iniciar el proyecto.

3) **Voluntariado.**

Es indispensable que un grupo de personas (tres o cuatro por colonia) puedan compartir el trabajo de crear una colonia controlada en su vecindario o lugar de trabajo y su gestión posterior. Esas personas pueden ser las que ahora los alimentan, conocen y tienen localizado a cada gato, incluso a nivel particular han esterilizado a muchos de ellos. Sin su colaboración este proyecto es inviable.

4) **Establecer lugares de alimentación y refugios.**

Antes de ocuparse de la captura es necesario establecer un horario de alimentación regular y preparar un lugar caliente y seco para dormir. Durante esta fase de precaptura, se debe alimentar a los gatos con comida tan nutritiva y de alta calidad como sea posible para mejorar su sistema inmunológico, a fin de que puedan soportar la tensión del cautiverio y la cirugía, y mejorar de las dolencias felinas comunes, como infecciones del aparato respiratorio superior. Se utilizará pienso seco, evitando restos de comida (pescado y comida casera).

El tipo de estación de alimentación que se utilice dependerá de la clase de acceso que tenga el territorio, pero siempre fuera de cualquier edificio. Si es posible, fijar platos y un dispensador automático de agua dentro de una caja de madera cubierta y abierta totalmente por un lado (así un gato no puede mantener a otro fuera). Si no se pueden alimentar diariamente, se puede instalar un dispensador automático de pienso seco. Si no es posible esa disposición parecida a una caja, lo mejor que se puede hacer es poner los platos y el agua tan lejos de la gente como se pueda.

Tanto la estación de alimentación como los refugios han de estar situados en puntos accesibles para los cuidadores y no visibles para los transeúntes. Donde quiera que se encuentre, la estación de alimentación hay que mantenerla limpia, no dejando platos vacíos ni latas alrededor.

5) Contar el número de gatos de la colonia y su estado.

Esta tarea es importante para organizar la esterilización y para gestionar la cantidad de jaulas necesarias para atraparlos. Se puede realizar cuando los gatos se acerquen a comer, lo que también permitirá conocer si hay gatos adultos amistosos o enfermos y tomar medidas anticipadas para la adopción o el cuidado veterinario antes de que los gatos estén bajo custodia.

6) Tener un espacio para la custodia.

Atrapar una colonia completa puede llevar varios días. Durante el periodo de captura y durante las siguientes 48-72 horas posteriores a la cirugía, se necesitará un espacio donde custodiar a los gatos capturados. Las trampas sirven de jaulas y los gatos no salen de ellas, excepto para la cirugía, hasta que se sueltan. El espacio para custodiarles necesita ser lo bastante grande como para reunir tantas trampas como gatos haya, con espacio para que los cuidadores se muevan a su alrededor para alimentar y limpiar. Estos espacios pueden ser garajes, sótanos, almacenes o patios, si lo permite el buen tiempo. Es necesario, por supuesto, mantener limpio ese espacio.

7) Protocolo veterinario.

Es necesario un acuerdo con las clínicas veterinarias que van a participar en el proyecto, que puede realizarse con ellas directamente o a través del Colegio de Veterinarios, y establecer un protocolo veterinario: examen clínico, anestesia, pruebas de leucemia e inmunodeficiencia felina, esterilización, identificación y un corte en la oreja, recto, aproximadamente de medio centímetro, que permite conocer rápidamente si un gato callejero ha sido esterilizado. Se debe considerar la eutanasia para los gatos con enfermedades graves y sin posibilidad de curación, para prevenir futuros sufrimientos y proteger a los gatos sanos de la colonia de ser contagiados. El tema de la eutanasia se debe discutir con el veterinario antes de empezar a esterilizar la colonia, de manera que todas las personas que vayan a intervenir en el proyecto estén de acuerdo.

8) **Captura.**

En esta etapa, todos los miembros de la comunidad o empresa laboral estarán informados de cómo funciona el programa de capturar-esterilizar-soltar y cuales son sus ventajas. Se ha instalado una estación de alimentación y un refugio, se ha establecido un patrón de alimentación regular, se conoce cuántos gatos hay, si algunos gatitos o gatos enfermos necesitan atención especial, se ha asegurado un espacio de custodia para el proyecto, se ha fijado el protocolo veterinario y la fecha específica para esterilizar a los gatos. Ahora se puede comenzar su captura.

Se utilizará en cada caso un método de captura diferente. Los gatos de buen carácter se recogerán con la mano por las personas que habitualmente estén en contacto con ellos cuando se alimentan. Para los gatos, que por su carácter desconfiado resulte imposible su acercamiento, se emplearán jaulas-trampa de unos 90 cm. de largo, con puertas posteriores, de manera que puedan hacer de jaulas dobles.

El factor más importante para una captura acertada es que los gatos tengan hambre, así que se debe retener el alimento por lo menos durante las 24 horas anteriores. Las jaulas se colocarán en el lugar donde habitualmente se les alimenta, colocando comida sabrosa al fondo, de manera que al entrar el animal salta un dispositivo que automáticamente cierra la jaula. Las jaulas han de permanecer vigiladas permanentemente.

Siempre que sea posible es mejor atrapar a la colonia completa de una vez, aunque requiere un trabajo mayor durante un corto tiempo, es menos trabajosa a largo plazo y la satisfacción es inmediata, ya que al esterilizar a toda o casi toda la colonia, el crecimiento de su población y el comportamiento fastidioso son puestos bajo control, mejorando la situación inmediatamente.

Es conveniente tener más trampas que gatos para poder atrapar a ese par de gatos que siempre quedan.

Por último, tenemos que hacer observar que la captura se hace al final del proceso y no al principio.

9) **Cuidado de los gatos en las trampas.**

Las trampas funcionan como jaulas. La alimentación y limpieza se realiza con seguridad mediante un divisor de la trampa que permite

aislar al gato en una mitad mientras se limpia y se pone agua, comida y un periódico en la otra. Se debe alimentar al gato y cambiar el periódico (que colecta la basura del gato) dos veces al día. Es necesario conocer que los gatos callejeros tienden a moverse desde la luz a la oscuridad, así que para que el gato vaya a uno de los extremos de la jaula, se pone una tela en ese extremo. Esa tela se empleará para cubrir parcialmente las jaulas para que los gatos allí encerrados se mantengan en calma. Alimento y agua deben ser quitados de las trampas la noche antes de la cirugía para que el gato tenga el estómago vacío y evitar que pueda vomitar y atragantarse durante la operación.

10) La intervención.

Una vez en la clínica se realizará un reconocimiento general para valorar el estado sanitario del gato, valorando en su caso si al animal se le pone en tratamiento o se opta por la eutanasia para evitarle el sufrimiento.

La intervención debiera ser realizada por un profesional veterinario experimentado en castraciones de colonias felinas, ya que al no poder pasar un postoperatorio largo la intervención tiene que ser muy controlada. En las hembras consiste en la extirpación de los ovarios y el útero (ovariohisterectomía) y en los machos en la extirpación de los testículos. Durante el transcurso de la intervención y bajo los efectos de la anestesia se le realizará un corte en la oreja para poder identificar rápidamente que es un animal esterilizado y pertenece a una colonia controlada. Después de la intervención se les inyectará un antibiótico de larga duración para evitar posibles infecciones. Se contará con la ayuda de los voluntarios colaboradores para observar a los gatos intervenidos y comunicar cualquier problema que pudiera surgir.

11) Supervisión después de soltarlos.

Si no hay complicaciones después de la cirugía, los gatos deben ser soltados después de las 48-72 horas en el mismo lugar donde se atraparon.

Una vez que los gatos se esterilicen y se suelten, el proceso todavía no termina, la supervisión a largo plazo de la colonia es vital. La amenaza más grande contra la eficacia de este proyecto para disminuir gradualmente las poblaciones de gatos callejeros es el abandono

continuo de felinos domésticos sin esterilizar que se incorporan a las colonias. Si no se supervisa la colonia a fin de conocer si hay recién llegados, un par de gatos abandonados comenzarán de nuevo el ciclo reproductivo. Para prevenir esta situación, los recién llegados deben ser atrapados y esterilizados. La supervisión continua de la colonia es también importante porque las condiciones cambian con el tiempo, nuevos vecinos que necesitan ser educados y conocer el proyecto, o pueden surgir problemas que resolver.

Así pues, aunque la captura y esterilización es la parte más intensiva del proceso, es solamente el principio, no el final.

4. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

- 1) **Coordinación.** Las funciones de la entidad (pública o privada) que coordine el proyecto deberá supervisar el programa, mediar entre los cuidadores de gatos y las autoridades e identificar las colonias de gatos callejeros.
- 2) **Voluntariado.** Las personas voluntarias que cuiden y controlen las colonias de gatos tendrán que poner mucho tiempo y esfuerzo, pero no deben tener que pagar nada de sus propios bolsillos. Las jaulas-trampa, los gastos veterinarios y la alimentación deben correr a cargo de la Administración.
- 3) **Espacio de custodia.** Lo ideal es que el espacio de custodia (será necesario recoger durante unos 5 días a los gatos de la colonia) se encuentre en la misma instalación donde se llevará a cabo la esterilización.
- 4) **Registro de colonias.** Las colonias esterilizadas deben ser registradas para propósitos estadísticos, para observar el crecimiento o declinación de la población. La información recopilada debe comprender cómo contactar con los cuidadores, la localización de la colonia y una descripción e historia de cada gato (color, edad, cuando y donde fue esterilizado, vacunas, microchip, si se pusiera).
- 5) **Ordenanza.** Se debe establecer una base jurídica en la que se detallen los servicios veterinarios, los fondos que se destinan y los requisitos y obligaciones de los cuidadores.
- 6) **Medios de comunicación.** La utilización de los medios de comunicación es una buena manera de concienciar a la población sobre

la tenencia responsable de los animales de compañía y hacer comprender la importancia de los proyectos de esterilización de los gatos callejeros.

5. DIVERSOS PAÍSES Y CIUDADES COMO REFERENCIA.

Francia. El Ayuntamiento de París decidió en el año 1992 llevar a cabo una prueba piloto en el Distrito XXIII, en el cual durante cuatro años fueron capturados, esterilizados e identificados 650 gatos.

Túnez. La capital realiza desde hace años una media de 6000 esterilizaciones y vacunaciones anuales.

Kenia. En el año 1992, en Lamú, la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA) a través de su programa denominado "Pet Respect" inició el desarrollo de un completo proyecto con la finalidad de establecer un control humanitario de la población felina.

Estados Unidos. Concretamente en California, en 1996, las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Diego desarrollaron un programa de control humanitario, consiguiendo colonias estables de gatos.

Reino Unido. Este país cuenta con más de veinte años de experiencia en el control humanitario de las colonias de gatos.

España. Madrid, Barcelona (Distrito de Gracia, campus de la Universidad, Cementerio de Les Corts), Mataró, Sitges, Gijón, Zaragoza, Getxo, Cádiz y otras.

6. UNA EXPERIENCIA EN SEGOVIA.

Esto que parece una utopía ya se está llevando a cabo en nuestra ciudad en los bloques de Mahonías (Ezequiel González, números 30 y 32) por parte de D^a Elizabeth Schmucky, vecina de uno de los bloques, quien con tesón y muchos gastos ha logrado controlar la colonia de gatos. Por esta labor fue nombrada Socia de Honor de nuestra asociación.

Segovia, 12 de julio de 2.007